



UROCULTIVO 1° CHORRO Y CHORRO MEDIO

- Se entregan al paciente 2 recipientes estériles para la recolección de las muestras.
 - Recolectar las orinas después de 3 horas de retención. Preferentemente durante la primera micción de la mañana.
 - Antes de la recolección **lavar muy bien los genitales externos** con abundante agua y jabón, correr el prepucio e higienizar muy bien el glande.
 - Enjuagar y secar con toalla limpia
 - Destapar el frasco **estéril** sin tocar el lado interno de la tapa y sostenerlo de manera que no apoye en sus genitales.
 - **Comience a orinar en el primer frasco, no más de 10 a 20 mL. Retener la micción. Tapar el frasco y seguir orinando en el segundo frasco, descartando la última porción de orina.**
 - Verificar que el cierre de los frascos sea el correcto.
 - Rotular ambos recipientes con su nombre y apellido, **diferenciándolos como primer chorro y chorro medio.**
 - **Conservar en heladera** y llevarlos al laboratorio dentro de las dos horas.
 - En el caso de tener que recolectar muestra de semen, primero se deben juntar las orinas.
 - **ATENCIÓN:** Los frascos estériles no tienen cierre hermético. Mantener en posición vertical para evitar derrames.
- NO PODEMOS RECIBIR MUESTRAS DERRAMADAS POR POSIBLE CONTAMINACIÓN Y NORMAS DE BIOSEGURIDAD.**