

UROCULTIVO 1º CHORRO Y CHORRO MEDIO

- Se entregan al paciente 2 recipientes estériles para la recolección de las muestras.
- Recolectar las orinas después de 3 horas de retención. Preferentemente durante la primera micción de la mañana.
- Antes de la recolección **lavar muy bien los genitales externos** con abundante agua y jabón, correr el prepucio e higienizar muy bien el glande.
- Enjuagar y secar con toalla limpia
- Destapar el frasco **estéril** sin tocar el lado interno de la tapa y sostenerlo de manera que no apoye en sus genitales.
- **Comience a orinar en el primer frasco, no más de 10 a 20 mL.** Retener la micción. Tapar el frasco y seguir orinando en el segundo frasco, descartando la última porción de orina.
- Verificar que el cierre de los frascos sea el correcto.
- Rotular ambos recipientes con su nombre y apellido, diferenciándolos como **primer chorro y chorro medio**.
- **Conservar en heladera** y llevarlos al laboratorio dentro de las dos horas.
- En el caso de tener que recolectar muestra de semen, primero se deben juntar las orinas.
- ATENCIÓN: Los frascos estériles no tienen cierre hermético. Mantener en posición vertical para evitar derrames.
NO PODEMOS RECIBIR MUESTRAS DERRAMADAS POR POSIBLE CONTAMINACIÓN Y NORMAS DE BIOSEGURIDAD.

- Horario de toma y recepción de muestras : de Lunes a Viernes de 7 h a 11 h y en sede central, Roca 1635, de 7 h a 12 hs